
Registro extralimital de *Sturnella magna* en Colombia: Tolima, Cordillera Central

Alonso Quevedo¹ & Bernabé López-Lanus²

Entre enero y septiembre de 1999 realizamos observaciones y registros auditivos del Chirlo Mirlo *Sturnella magna* en la cordillera Central, departamento del Tolima. Las grabaciones están depositadas en el Banco de Sonidos Animales del Instituto Alexander von Humboldt, Colombia, y en la National Sound Archive, Wildlife Section, Inglaterra. El 12 de enero y el 9 de agosto de 1999 contamos entre uno y tres ejemplares de esta especie en la vereda La Cascada, municipio de Anzoátegui, a 3010 m, con un estimado de 10 ejemplares según información local. El 28 de septiembre del mismo año observamos ocho individuos en la finca El Caucho, municipio La Sabianca, a 3400 m, y el 29 de septiembre observamos dos individuos en la "Inspección de Letras Ángulo E", municipio de Herveo, a 3695 m. Todos los registros se efectuaron en zonas deforestadas con terrenos destinados al pastoreo de ganado bovino y a la siembra de papas. Por lo general la especie fue observada en pastizales bajos, césped y sectores arados en zonas de pendiente baja y hasta en sectores de 40° de declive. Por lo menos en la vereda La Cascada los pobladores locales conocían la especie desde hace unos diez años, siendo identificados como "Chirlos Mirlos", nombre tanto vernáculo como vulgar para otras poblaciones de la especie dentro de su distribución conocida en Colombia (A. Quevedo & B. López, obs. pers.).

1 Fundación Proaves de Colombia. Email: alonsoquevedo@hotmail.com

2 Conservacion Internacional Colombia, Carrera 13 # 71-41, Bogotá, Colombia.

Email: b.lopez-lanus@conservation.org.co

Sturnella magna se encuentra representada en Colombia por tres razas: *S. m. praticola* de los llanos hasta 450 m, *S. m. paralius* de zonas tropicales y subtropicales del norte de Colombia y base occidental de la cordillera Oriental hasta 2700 m, y *S. m. meridionalis* en la cordillera Oriental desde el departamento de Norte de Santander hasta Cundinamarca. Esta última con una población aislada en las cabeceras del río Magdalena en Huila, registrada en zona subtropical y templada desde los 1500-1800m hasta los 3500 m (Meyer de Schauensee 1948-1952, Jaramillo & Burke 1999, J. I. Hernández-Camacho com. pers.). Ante la evidencia de una población de *Sturnella magna* de zona templada en las cabeceras del valle del Magdalena, no se puede descartar que esta población de la cordillera Central se trate de la misma raza (*S. m. meridionalis*), con individuos arribados a las latitudes del departamento de Tolima desde el sur de la cordillera Central (Huila). No obstante, cabe la posibilidad de que por aislamiento geográfico esta población del Tolima se trate de una raza no conocida, para lo cual, de un modo u otro, es necesaria la colecta de especímenes y su estudio (J. I. Hernández-Camacho com. pers., Quevedo & B. López, obs. pers.). Además de la confusión que genera el descubrimiento de *Sturnella magna* en la cordillera Central en cuanto a su nominación subespecífica, cabe la posibilidad de que esta población esté formada por ejemplares arribados hace poco tiempo (unos diez años según la información de los lugareños por dar un ejemplo). Esto coincidiría con la deforestación del terreno y el establecimiento colonial de nuevas fincas para pastoreo y agricultura, lo cual optimiza el asentamiento de esta especie en la región.

AGRADECIMIENTOS

Al fallecido Jorge I. Hernández-Camacho por comentarios varios, a Walter Weber por el préstamo de su biblioteca y a Tomás Cuadros por la revisión de este texto.

LITERATURA CITADA

Jaramillo, A. & Burke, P. 1999. New World Blackbirds, The Icterids. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Meyer de Schauensee, R. 1948-1952. The birds of the Republic of Colombia. Caldasia 1-5 (22-26) 251-1212.